



FCI – Standard nr 205/ .20. 02.1989 / D (muudetud 9.6.1999)

CHOW CHOW

(CHOW-CHOW)

PÄRITOLU: : Hiina

EESTKOSTEMAA : Suurbritannia

KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE

AEG:

24. 06. 1987

KASUTUS: Pere- ja seltsikoer, silmatorkava lastesõbralikkusega, tähelepanelik valvur, rõõmsameelne ja õpihimuline töökoer.

FCI KLASSIFIKATSIOON:

Rühm 5
Spitsilaadsed ja algupärased tõud

Alarühm 5
Aasia spitsid ja sugulastõud

Töökatseta.

ÜLDMULJE:

Elav, kompaktne, lühike ja tihke. Eelkõige aga väga harmooniline, lõvitaolise üldise olemusega, uhke ja väarika hoiakuga, tugeva ja pehmejoonelise kehaehitusega, saba on kantud hästi selja kohal.

KÄITUMINE / ISELOOM :

Rahulik koer, väga valvas, sinkjasmusta keelega, ainulaadne oma jäigalt puise liikumisviisiga. Isepäine, truu, samas ka eemalehoidev.

PEA:

PEAPIIRKOND :

Kolju : Lame ja lai, silmade alt hästi täitunud.

Üleminek laubalt koonule: mitte rõhutatud.

NÄOPIIRKOND :

Ninapeegel : Suur ja lai, alati must (välja arvatud kreemjad või peaaegu valged chow'd, kellel võib ninapeegel olla heledamalt värvunud; nagu ka sinised ja hirvepunased chow'd, kelle ninapeegel on vastavat värvi.)

Koon : Mõõduka pikkusega, silmadest kuni koonutipuni kogu pikkuses lai (mitte pikisuunas ahenev nagu rebasel).

Mokad : Mokad ja suulae limaskestad on mustad (sinkjasmustad). Igemed on eelistatavalt mustad. Keel on sinetavalt must.

Lõuad / Hambad : Hambad on tugevad ja tasased, tugevad lõuad on perfektse korrapärase ja täiskomplektse käärhambumusega, kusjuures ülemised lõikehambad ulatuvad vahet jätmata üle alumiste ning hambad väljuvad lõualuust otse.

Silmad : Tumedad ja ovaalse kujuga, keskmise suurusega ja tihedate silmalaugudega. Sinistel ja hirvepunastel chow'del on lubatud vastavat värvi silmad. Tihedate silmalaugudega ja entroopiumivabade silmade hindamisel ei või hinnet alandada vaid nende suuruse pärast.

Kõrvad : Väikesed, paksud, tipust kergelt ümardunud, jäigalt püstised ja teineteisest küllalt kaugel asetsevad, samas veidi teineteise suunas ning ning silmade kohal ettepoole kaldus, andes sel moel tõule nii iseloomuliku, pahura ilme (*Scowl*). See ilme ei või aga tekkida pelgalt lõtvadest nahavoltidest laubal.

KAEL:

Tugev, tüse, kuid mitte lühike, kergelt kaarduv ja sujuvalt õlgadele liituv.

KERE:

Selg : Lühike, sirge, tugev.

Nimme (lanne) : Jõuline.

Rind : Lai ja sügav; hästi kaarduvate roietega, kuid samas mitte tünnikujuline

SABA:

Kõrge asetusega ja kindlalt selja kohal hoiduv.

JÄSEMED:

ESIJÄSEMED : Esijalad on sirged, mõõduka pikkusega ja tugevaluulised.

Õlad : Lihaselised ja asetsevad kaldu.

TAGAJÄSEMED : Lihaselised.

Kannaliiges : Asetseb madalal ja on minimaalselt nurgitunud, kuna see on vältimatu iseloomuliku puise kõnnaku puhul. Kannaliiges ei või aga mingil juhul ette

suunas läbi painduda.

Pöiad : Kannast alates püstised.

Käpad : Väikesed, ümarad, kassikäpa taolised ja hästi varbaile toetuvad.

LIKUMINE:

Lühike ja puine. Esi- ja tagajalad liiguvad omavahel paralleelselt ja otse ettesuunas.

KARVKATE

KARV : Pika- või lühikarvalised.

Pikakarvaline: Rikkalik, tihe, sirge ja püstine. Kattekarv on pigem karmi tekstuuriga ja sellele lisandub pehme, tihe alusvill. Eriti tihe osa ümber kaela moodustab laka või kaeluse. Kintsude tagaküljel on hästi väljakujunenud püksid.

Lühikarvaline: Lühike, rikkalik, tihe, sirge, püstine ja mitteliibuv, plüüsitaolise tekstuuriga. Igasugust kunstlikku karvkate lühendamist, millega püütakse muuta loomulikke piirjooni või üldmuljet, tuleb negatiivselt hinnata..

VÄRVUS :

Ühevärviline must, punane, sinine, hirvepunane, kreemjas või valge, sageli varjunditega, kuid mitte laiguline või kirju. Saba alumine külg ja püksid kintsude tagaküljel on sageli heledamat tooni.

SUURUS :

Turjakõrgus : Isased: 48 – 56 cm
Emased: 46 – 51 cm

VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodust tuleb lugeda vigadeks, mille aste sõltub otseselt kõrvalekalde ulatusest.

N.B. : Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Maret Kärdi tõlge

saksakeelsest originaalist ,jaanuar, 2003,
heaks kiidetud EKL juhatuses 6 märtsil 2003 protokoll nr 2.